

Le grand corbeau

Description

Ordre : Passereaux ; Famille : Corvidés

Taille:50 à 65 cm de long

Envergure: 1m15 à 1m30

Poids: 1 à 1,3 kg

Entièrement noir, il se caractérise notamment par un bec énorme et une queue cunéiforme (en forme de losange).

Son cri est puissant et rauque avec des variations d'intonations (crock-crock).

Le grand corbeau ne fait pas partie de la grande famille des rapaces diurnes, dans nos Pyrénées il nous arrive de le rencontrer en compagnie des vautours fauves, ou des milans noirs, et il est à mon avis un oiseau de légende comme le gypaète barbu ou bien encore le grand tétras.

Le grand corbeau promène une réputation de "mauvais garçon" depuis des siècles. Jugé répugnant et maléfique par nos ancêtres, il fut chassé pendant de longues années, avant d'être protégé par un arrêté du avril 1981 dans le cadre de la loi sur la Protection de la nature.

En France on le rencontre dans les Pyrénées, mais également en Corse, dans le cotentin et sur le littoral méditerranéen.

Il fréquente la basse et la moyenne montagne, les falaises de plaine et du bord de mer. On peut le rencontrer à une altitude de plus de 3000 mètres.

Presque exclusivement charognard, il se nourrit aussi de petits rongeurs, d'oeufs, d'oisillons, de batraciens et de diverses.

Cédant à la facilité, il rode souvent dans les décharges publiques; ils se disputent des déchets tout juste consommables avec les milans noirs.

C'est aussi un prédateur : il pille les nids d'oiseaux plus gros que lui (vautours), et n'hésite pas à s'attaquer aux portées de mammifères.

Le grand corbeau est avant tout un as de la voltige. Il est capable d'effectuer d'incroyables acrobaties en vol notamment lors des parades nuptiales : looping, piqués, orbes et planer n'ont aucun secret pour lui.

Il étonne également par son "intelligence": Il est capable de bredouiller quelques mots au bout d'un long apprentissage. Dans les campagnes autrefois, les paysans le capturait au nid, le nourrissait et arrivait à l'apprivoiser. Il restait fidèle à son maître sans pour autant être captif. Il surprenait par son instinct joueur, et l'un de ses amusements préférés consistait à piquer les pieds des hommes et relevant la tête, il guettait leur réaction.

Il passe son temps à se chamailler avec ses congénères. Et il faut se méfier de son comportement voleur (comme la pie sa cousine).

Les paysans l'accusaient autrefois d'arracher le chaume des toitures. Il fut persécuté et disparut de nombreuses régions en France.



Aujourd'hui il réapparaît petit à petit; près de Tarbes, les grands corbeaux s'attaquent même aux poules et jeunes brebis (ceci s'explique par la fermeture d'une déchetterie qu'ils avaient l'habitude de fréquenter). Ils attaquent par derrière, car leur bec n'est pas assez puissant pour traverser la peau..

Le grand corbeau est un guetteur né. Il sera le premier à repérer une carcasse, mais incapable de dépecer il avertira les vautours et se contentera des restes (auparavant il se sera attaquer aux yeux).

A l'instar des vautours, les grands corbeaux observent aussi les lois de la hiérarchie. Les adultes se servent en premier pour donner la becquée aux plus jeunes sans cesse affamés.

Le grand corbeau dissimule la nourriture lorsqu'il est rassasié, mais il oublie bien vite sa cachette !

Reproduction

On prétend qu'ils s'accouplent à vie comme le gypaète barbu ou l'aigle royal, mais il semblerait que ce comportement soit lié à leur faible densité, si bien qu'ils soient contraints à une fidélité forcée, à défaut





d'autres partenaires.

Dès les premiers jours de printemps, le couple se consacre à la construction du nid dans une paroi rocheuse ou dans l'anfractuosit   d'un rocher. Branchages et laine de mouton constituent l'essentiel de l'ouvrage. R  am  nag   chaque ann  e il finit par   tre   norme.

La femelle pond 3    6 oeufs de couleur bleu p  le ou verd  tre mouchet  s de gris ou de brun une fois dans l'ann  e (il arrive qu'elle ponde une deuxi  me fois en cas d'  chec de la premi  re ponte comme le vautour fauve).

La femelle couve une vingtaine de jours, le m  le assurant le ravitaillement.

Pendant 50 jours environ, 2    4 jeunes sont nourris. Il arrive parfois que la nich  e soit la proie de la martre ou de la genette malgr   la vigilance des parents.

Apr  s leur   mancipation, les jeunes adoptent une existence gr  gaire,    la recherche d'un territoire propice    leur survie.

Visibles le plus souvent en couple, on peut   galement les rencontrer en groupe d'une vingtaine d'individus d  s qu'une carcasse est rep  r  e.

Leur population longtemps en d  clin se chiffre aujourd'hui    plus d'un millier d'individus en France. S  d  ntaire il est farouche et prudent.



Le corbeau freux Corvus Frugilegus

Description

Le Corbeau freux est un oiseau de taille moyenne avec une envergure de 90 cm. Son plumage est noir avec des reflets pourpres. Il p  se entre 400 et 530 grammes.

Sa face se d  nude et devient blanche avec l'  ge. Son bec est moins puissant que celui de la corneille noire.

Son habitat se situe dans les terres arables avec bocages et les p  riph  ries des villes.

Le corbeau freux est un oiseau diurne qui cherche sa nourriture au sol.

Insectes, souris, c  r  ales,   ufs, oisillons et divers v  g  taux font partie de son r  gime alimentaire.

Il vit, niche et se d  place en colonies de quelques dizaines de couples, mais celles-ci peuvent parfois atteindre jusqu'   mille couples.

Il niche au sein d'une corbeauti  re et la ponte du corbeau freux commence d  but avril. L'incubation dure de 16    18 jours. En moyenne, trois    six jeunes naissent. Ils quitteront le nid    30 jours, et ils atteindront leur maturit   sexuelle    un ou deux ans.



Pierre-Marie (CM2)

http://perso.orange.fr/marie-christine.dehayes/Presentation_grand_corbeau.htm

http://perso.orange.fr/marie-christine.dehayes/Reproduction_corbeau.htm